

## **LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y MICROBIOLÓGICOS**

### **INDICACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE COPROPARASITOLÓGICO SERIADO**

- Durante 7 (siete) días se deberá recoger una pequeña porción (equivalente a una cucharada) de cada una de las deposiciones que realice.
- Introduzca cada una de esas porciones en el recipiente con formol que le ha provisto el laboratorio.
- Mantenga el recipiente refrigerado hasta el momento de entregarlo en el laboratorio
- El recipiente que se le entrega con FORMOL mantengalo fuera del alcance de los niños (TOXICO)

### **INDICACIONES PARA ESCOBILLADO DE MUCUS ANAL**

- La recolección se hará durante la mañana (temprano, en la cama y antes de mover el vientre)
- El paciente estará acostado boca abajo y un ayudante le separara fuertemente los glúteos, para dejar al descubierto la zona anal.
- Tomar con los dedos índice y pulgar, por uno de los extremos, una gasita y pasarla cuidadosamente sobre el ano en forma radiada (no menos de ocho veces)
- Depositar l,uego, la gasita en el recipiente que le fue provisto por el laboratorio.
- -Una vez juntadas las muestras se envían al laboratorio con los datos del paciente.

**\*DURANTE ESTOS 7 DIAS EVITAR LA INGESTA DE VERDURAS DE HOJA VERDE, SEMILLAS Y FRUTAS CON HOLLEJOS\***